

## ALMER ROD PELET

RODENTİSİT PELET

### ***İÇERİK***

- \*Brodifocaum
- \*Denatonium benzoate
- \*Cezbedici yemler ve dolgu malzemeleri

### ***KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:***

ALMER ROD PELLET ye istasyon kutuları içine fare mücadelesi için 15-30 g'lık, sıçan mücadeles için 60-90 g'lık kümeler halinde konulmalıdır. ALMER ROD PELLET konulan istasyonlar sıçan ve farelerin kolayca ulaşabileceği, pisliklerinin görüldüğü, kemirme izleri bulunan yerlere, duvar kenar ve köşelerine, dolap arkalarına, tavan aralarına bırakılır.

### ***UYARILAR:***

Bu alanlarda fare yemine alternatif yiyecekler bırakmamaya çalışmalıdır. ALMER ROD PELLET haftada bir kontrol edilmeli ve azalmışsa tamamlanmalıdır. Ölümler ilk yemin konulduğu günün 4-5 gün sonrasında görülür ve genellikle yuvalarda oluşur. Eğer ölmüş fare ve sıçan varsa bir eldivenle tutularak gömülmelidir. Çocukların ve hedef dışı hayvanların ulaşamayacağı yağmur, rutubet gibi hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde istasyonlar içinde ya da tespit edilen yuva içlerine konulmalıdır. Yem istasyonlarının üzerine bilgisi olmayan kişiler için " Dikkat Fare Zehiri" uyarısı yazılmalıdır.

